



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران

آبسه پری آنال

بیمارستان امام سجاد(ع) شهریار

شماره بیمارستان ۶۵۲۲۶۰۴۳

واحد آموزش سلامت

باز نگری دیماه ۱۴۰۱

پزشک تایید کننده: دکتر حسن رضایی جراح

عمومی

سایت بیمارستان

www.hospes.iums.ac.ir

آبسه پری آنال یک عفونت موضعی در اطراف مقعد است. مهمترین علامت آبسه پری آنال، درد اطراف یا داخل مقعد است که طی چند روز شدید می‌شود و به صورت دردی طاقت فرسا در می‌آید. این درد ممکن است با علائمی مانند تب، لرز، تورم، قرمزی، درد موقع نشستن و خونریزی در هنگام دفع مدفوع همراه باشد. درمان اصلی آبسه پری آنال مراجعه به جراح و تخلیه آن است.

نکات و مراقبت های بعد از درمان آبسه مقعدی

- روزانه ۲-۱ لیتر مایعات بنوشید.

- از سبزیجات و میوه ها استفاده کنید.

- توجه داشته باشید که فیستولهای اطراف پریینه طی ۵-

۴ هفته و زخمهای عمیق این ناحیه طی ۱۶-۱۲ هفته

باید بهبود یابند.

این امکان وجود دارد که بعد از جراحی مقداری درد

خفیف احساس نمایید که طبیعی بوده و ناشی از زخم

جراحی و برش می باشد و بعد از مدتی برطرف می شود.

ممکن است پزشک برای کاهش و تسکین درد ناشی از جراحی مسکن‌هایی را برای شما تجویز کند که باید آن ها را به موقع و طبق دستور مصرف استفاده کنید.

از استراحت مطلق خودداری نموده و روزانه مقداری پیاده روی داشته باشید و هرروز مقدار آن را از قبل بیشتر نمایید. قدم زدن موجب افزایش جریان خون شده و بدین ترتیب از بروز یبوست تا حد زیادی جلوگیری می کند.

فعالیت های خود را هنگامی که احساس خستگی کردید رها کرده و استراحت نمایید.

- بعد از ترخیص در موقع مشخص به پزشک خود مراجعه نمایید.

منبع: کتاب برونر و سودارث گوارش ۲۰۱۹