



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران

ختنه



بیمارستان امام سجاد(ع) شهریار

شماره بیمارستان ۶۵۲۲۶۰۴۳

واحد آموزش سلامت

بازنگری: شهریور ۱۴۰۴

منبع: کتاب برونر و سودارث گوارش ۲۰۲۲

سایت بیمارستان

www.hospes.iums.ac.ir

۱. ناحیه‌ی ختنه را تمیز نگه دارید و پوشک را هر ۲ ساعت یک بار تعویض کنید.

۲. پوست آلت باید خشک و تمیز نگه داشته شود و شست و شو با آب خالی و خشک کردن با پارچه تمیز کافی است.

۳. با اولین ادرار بعد از ختنه ممکن است احساس درد و گریه ایجاد شود که به علت تماس ادرار گرم با سر ملتهب آلت است و نگرانی ندارد.

۴. پمادهای تجویز شده طبق دستور پزشک طب بر روی محل عمل استفاده شود.

۵. در صورت بروز مشکلات زیر به پزشک اطلاع دهید:

- تب کردن کودک

- ورم شدید آلت و بیضه

- مشکلات در ادرار کردن

- ادرار نکردن کودک حداکثر ۲۴ ساعت بعد از ختنه

- زخم های پوسته پوسته و ترشح کننده

- قرمزی ناحیه‌ی ختنه بیشتر از ۵ روز

- خونریزی محل ختنه

- تغییر رنگ و تیره شدن نوک آلت

- خون مردگی وسیع آلت و بیضه

- افتادن حلقه در کمتر از ۳ روز یا نیفتادن حلقه تا ۱۰

روز بعد از ختنه

۶. به طور معمول طول درمان ۱۰-۵ روز است، اگر تا ۸ روز حلقه هنوز باقی است (دیر افتادن حلقه) کودک را هر روز استحمام کنید و هر بار ۱۰-۵ دقیقه در وان قرار دهید تا محل چسبندگی نرم شود و از زخم جدا شده و رینگ خارج شود.

۷. اگر برای این عمل کودک، بیهوشی گرفته باشد باید تا هشت ساعت بعد از عمل غذای سبک (در حد سوپ) بخورد که دچار عارضه تهوع بعد از بیهوشی نشود.

۸. به فعالیت‌های فرزند خود دقت داشته باشید، به کودک نوپای خود کمک کنید تا به آرامی قدم بردارد. اما دقت داشته باشید که بازی و فعالیت‌های خشن و خطرناک نداشته باشد و بازی‌هایی آرام انجام دهد. به‌طور کلی نیازی نیست که فرزند خود را محدود کنید؛ اما باید به فعالیت و بازی‌های او دقت و نظارت داشته باشید.

منبع: کتاب ختنه دکتر صدف علی پور

