

جراحی های مغزی به همین روش انجام می گیرد و بسته به ضایعه محل برش جراحی متفاوت است.

مراقبت پس از جراحی:

پس از جراحی مراقبت از زخم بسیار مهم است تعویض پانسمان بسیار مهم است و حداقل باید یک روز در میان انجام شود.

هنگامی که بیمار از بیمارستان مرخص شده و در منزل است باید نهایت توجه و مراقبت از زخم بعمل آید داروهای تجویز شده توسط پزشک باید به دقت مصرف شوند بخیه های جراحی باید دو هفته پس از جراحی برداشته شوند در طول این مدت از خاراندن یا مالش شدید زخم و اطراف محل بخیه ها پرهیز شود. شستشوی سر پس از ۷۲ ساعت یا روز سوم پس از عمل بلامانع است ولی باید از مالش پوست محل عمل خودداری شود.

مراقبت در منزل:



کرانیوتومی: شامل باز کردن جمجمه توسط عمل جراحی جهت دسترسی به ساختمان های داخل جمجمه می باشد از این روش برای برداشتن تومورهای مغزی یا کاهش فشار داخل جمجمه یا خارج کردن لخته از داخل مغز و کنترل خونریزی استفاده می شود. جراح جمجمه را برش می دهد تا تکه استخوانی را به اندازه مورد نظر بردارد پس از جراحی تکه استخوانی دوباره در جای خود قرار می گیرد و توسط بخیه از جنس سیم یا سیمان مخصوص در جای خود محکم می شود اکثر موارد



دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی شیراز

بیمارستان امام سجاد(ع) شیراز

مراقبت های بعد از کرانیوتومی

شماره بیمارستان ۶۵۲۲۶۰۴۳

واحد آموزش سلامت

باز نگری شهریور ۱۴۰۴

منبع: کتاب برونر و سودارث گوارش ۲۰۲۲

سایت بیمارستان

www.hospes.iums.ac.ir

زخم همواره خشک و تمیز نگه داشته شود

از چرخاندن بیش از حد سر خودداری کنید.

در صورت داشتن احساس طعم شوری در دهان یا ترشح از ناحیه ی جراحی، سریعاً به پزشک مراجعه کنید.

از سرفه، عطسه، باد انداختن در بینی خودداری کنید.

چون این اعمال موجب فشار بر ناحیه می شود. در صورتی که مشکل دیگری از نظر سلامتی نداشته باشید، رژیم غذایی محدودیت خاصی ندارد.

رژیم سبزی و میوه جات جهت پیشگیری از یبوست و جلوگیری از زور زدن هنگام دفع پیشنهاد می گردد.

داروهای تجویز شده توسط پزشک علی الخصوص آنتی بیوتیک ها و ضد تشنج ها حتماً در ساعت مقرر استفاده گردد.

مهم ترین خطر پس از جراحی بروز علائم کاهش سطح هوشیاری ناشی از ایجاد خونریزی یا بالا رفتن فشار داخل جمجمه به دلایل مختلف است.

بیمار ممکن است نتواند از دستورات ساده هم پیروی کند ممکن است زمان مکان یا اشخاص را نشناسد یا جواب های بی ربط به سوالات دهد.

بسیار مهم است که در صورت بروز کاهش در سطح هوشیاری بیمار فوراً به پزشک اطلاع داده شود.

خطر بروز تشنج همواره پس از اعمال جراحی مغزی وجود دارد و با وجود داروهایی که پس از ترخیص تجویز می شود ممکن است این اتفاق در ماهها و سالهای بعد رخ دهد بنابراین لازم است :

اقدامات زیر در منزل مورد توجه قرار گیرد :

بیمار را در وضعیت راحت روی زمین قرار دهید. در زمان بروز تشنج همواره خطر سقوط از تخت وجود دارد بیمار را به پهلو بخوابانید وسایل و اشیا

ء نوک تیز

را از اطراف بیمار دور کنید

در زمان استراحت یا خوابیدن سر و تنه بالاتر قرار گیرد

این وضعیت را می توان با قرار دادن دو بالش مناسب زیر تنه و سر و حفظ وضعیت سر در حالت مناسب انجام داد.

این کار کمک زیادی در جلوگیری از افزایش فشار داخل جمجمه و بروز عوارض خطرناک است.

منبع: برونر و سودارث مغز و اعصاب

